

## UPUTA O LIJEKU

### OPERIL P 0,025% sprej za nos za djecu

*oksimetazolinklorid*

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke.**

Ovaj lijek je dostupan bez liječničkog recepta. Ipak, morate ga primjenjivati oprezno kako biste postigli najbolji učinak.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
- Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Obavezno kontaktirajte liječnika ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 3 dana.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

#### **U ovoj uputi:**

1. Što je Operil P 0,025% sprej za nos i za što se koristi
2. Prije nego počnete primjenjivati Operil P 0,025% sprej za nos
3. Kako primjenjivati Operil P 0,025% sprej za nos
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Operil P 0,025% sprej za nos
6. Dodatne informacije

### **1. ŠTO JE OPERIL P 0,025% SPREJ ZA NOS I ZA ŠTO SE KORISTI**

Operil P 0,025% sprej za nos namijenjen je djeci u dobi od 2 do 7 godina. Za odrasle i djecu stariju od 7 godina namijenjen je Operil 0,05% u obliku spreja za nos ili kapi za nos.


Operil P sadrži oksimetazolin. Oksimetazolin se upotrebljava kao nosni dekongestiv, odnosno lijek za sprječavanje začepjenosti nosa. Sužavanjem krvnih žila u nosu smanjuje otečenost sluznice nosa i lučenje sluzi, olakšava disanje kroz nos, otvara ulaze u nazalne i paranazalne sinuse (nosne šupljine i došupljine), povećava prohodnost kroz Eustahijevu tubu (cjevčica koja povezuje unutarnje i vanjsko uho), te tako ublažava prateće znakove hunjavice. Njegovo djelovanje počinje već nakon nekoliko minuta i traje 6 - 8 sati, maksimalno 12 sati, te postupno opada 6 sati nakon primjene.

Operil P se upotrebljava kod:

- upale nosne sluznice uzrokovane prehladom (akutni rinitis)
- peludne hunjavice (alergijski rinitis)
- upale nosnih šupljina i došupljina (nazalnih i paranazalnih sinusa)
- upale srednjeg uha (otitis media).

**Važno je da djetetu NE DAJETE više od jednog lijeka za ublažavanje simptoma akutnog rinitisa, alergijskog rinosinitisa ili upale srednjeg uha, jer različiti lijekovi mogu sadržavati iste djelatne tvari što može dovesti do nastanka neželjenih učinaka.**

### **2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI**



## **OPERIL P 0,025% SPREJ ZA NOS**

### **Nemojte davati djeci Operil P sprej za nos:**

- ako su alergična (preosjetljiva) na djelatnu tvar (oksimetazolin) ili bilo koji drugi sastojak lijeka naveden u djelu 6.
- ako imaju suhu upalu sluznice nosa sa krasticama (atrofičnu upalu)
- ako su mlađa od 2 godine

### **Budite posebno oprezni s Operil P sprejem za nos**

#### **Operil P 0,025% kapi za nos ne smiju se primjenjivati za samoliječenje u djece, ako dijete ima:**

- kronično zatajenje srca
- povišeni krvni tlak (hipertenzija)
- poremećaje srčanog ritma (srčanu aritmiju)
- povišen očni tlak (glaukom zatvorenog) kuta
- nasljedni enzimski poremećaj stvaranja hema (porfirija)
- šećernu bolest
- kroničnu upalu sluznice nosa
- povećanje aktivnosti štitnjače (hipertireoza)
- u terapiji MAO inhibitore (ili je prošlo manje od 14 dana od prestanka liječenja) ili tricikličke antidepressive
- povećanje prostate

U spomenutim slučajevima lijek se smije primjenjivati samo uz nadzor liječnika.

Bez liječničkog nadzora Operil P 0,025% sprej za nos ne smijete upotrebljavati dulje od 5 dana i to isključivo u propisanim dozama, kako ne bi došlo do povratnog učinka, odnosno pojave upale sluznice nosa izazvane lijekom.

Produljenu i prekomjernu uporabu Operil P 0,025% spreja za nos potrebno je izbjegavati zbog moguće pojave smanjenja terapijskog učinka i nastanka povratnog otoka sluznice nosa i začepljenja (kongestije). To dovodi do potrebe za opetovanom primjenom lijeka i kronične primjene. Dulja primjena oksimetazolina od preporučene može uzrokovati promjene površine sluznice s oštećenjima, suhoćom sluznice i nastankom krastica.

Operil P 0,025% sprej za nos ne smije se primjenjivati u djece mlađe od 2 godine.

Plastična bočica s lijekom namijenjena je samo za jednog bolesnika. Zbog opasnosti prenošenja zaraze istu bočicu ne smije upotrebljavati više osoba. Nakon uporabe nastavak za nos treba obrisati čistim rupčićem.

### **Uzimanje drugih lijekova s Operil P sprejem za nos**

Ako Vaše dijete istodobno uzima ili je uzimalo bilo koje druge lijekove, pa i one koji se mogu nabaviti bez recepta, prije uporabe Operila P spreja za nos obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Općenito za oksimetazolin vrijedi da je posebna pozornost potrebna u slučaju uzimanja nekih od sljedećih lijekova jer istodobna primjena s oksimetazolinom može dovesti do interakcija i nastanka neželjenih događaja:

- Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti ili depresije iz skupine inhibitora monoaminoooksidaze (**MAO inhibitori**) ili prekid liječenja ovim lijekovima unatrag 14 dana - kod istodobne primjene postoji rizik od značajnog povišenja krvnog tlaka. Mogući simptomi su teška glavobolja, bol u prsima, privremeni prestanak disanja, znojenje.
- **Atomoksetin** – lijek za liječenje poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje - kod istodobne primjene može doći do pojačanja učinka na srce s povišenjem vrijednosti krvnog tlaka i pulsa.

